

Leimay

Taimekaitsevahend Fungitsiid

Kasutusala: kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrje

Leimay-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Toode sisaldab ohtlikku ainet: amisulbroom

Eesti reg. nr: 0377/26.04.10

Toimeaine: amisulbroom 200 g/l

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Pakendi suurus: 1 l, 5 l ja 10 l

Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt



Hoiatus

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Loa valdaja, tootja ja pakendaja:

Nissan Chemical Europe S.A.S.

Parc d'Affaires de Crecy,

10A rue de la Voie Lactée

69370 Saint Didier au Mont d'Or,

Prantsusmaa

Tehniline teave:

Bayer OÜ
Bayer CropScience
Lõõtsa 12
11415 Tallinn
Tel: 58505566

Ohutusnõuded: Toote käitlemisel kandke sobivaid isikukaitsevahendeid (jalanõud, kaitsekindaid, näokaitse).

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara-ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.

Esmaabi: Kannatanu viia ohutsoonist eemale. Eemaldada kohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbinud riided ja kahjutustada need ohutult. Transportida ja asetada kannatanu külili asendisse.

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha suust-suhu elustamist (või kunstlikku hingamist). Hoida kannatanu soojas ning lasta tal puhata. Pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: eemaldada kohe määrdunud rõivad, jalanõud, sokid. Pesta nahka rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse tekkimisel ja püsimisel pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada otsekohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 min ja pöörduda silmaarsti poole.

Allaneelamisel: mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole. Loputada suud veega.

Ravi abinõud: sümptomaatiline ravi. Antidooti ei ole teada.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas, hästiventileeritavas lukustatud kohas. Hoida otsese päikesekiirguse eest. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Toodet tuleb kaitsta külma eest. Säilivusaeg 2 aastat.

Taara purunemisel: Katta väljavoolanud preparaat liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imbinud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.

Taara kahjutustamine: Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Kasutamine

Leimay on kontaktne, kaitsva toimega fungitsiid kartuli-lehemädanikku *Phytophthora infestans* tõrjeks. Leimay-ga tuleb pritsida profülaktiliselt, enne haiguse ilmumist. Hilinemine pritsimisel võib põhjustada olulist saagi langust. Leimay kasutamine pärast lehemädaniku ilmumist (1% lehest on kahjustunud) ei ole soovitatav. Leimay-d võib kasutada kartuli igas kasvufaasis. Töödelda võib kõiki kartulisorte. Leimay-d võib kasutada kartuli kasvufaasides esimesest lehest kuni mugulate küpsuse alguseni (BBCH 21-91).

Resistentsuse vältimine

Amisulbroom kuulub Qil (Quinone inside Inhibitors) grupi fungitsiidide gruppi. Vähendamaks resistentsuse tekke väljakujunemist, ei tohiks terve mädanikutõrje programmi raames ühel hooajal kasutada Leimay-d või mõnda muud Qil grupi fungitsiidi rohkem kui neljal pritsimiskorral.

Kasutamine:

Kulunorm 0,5 l/ha.

Pritsimiskordi maksimaalselt 4, kusjuures iga pritsimise vahele peaks jääma 7 kuni 10 päevane intervall. Maksimaalne lubatud kogus on 2,0 l/ha kasvuperioodi jooksul. Ooteaeg 7 päeva (viimane pritsimine enne saagi koristamist).

Vee hulk: 200-500 liitrit/ha.

Pritsimise aeg

Esimene pritsimine tehakse kohe kui tekib lehemädanikku nakatumise oht. Esimene pritsimine Leimay-ga peab olema tehtud ajaks, mil samas vaos kasvavate kartulitaimede lehestikud hakkavad omavahel kokku puutuma.

Suure lehemädaniku riskiga perioodidel ning pealsete kiire arengu ajal peaks pritsimine toimuma 7-päevaste intervallidega. Kui lehemädaniku risk on madal, võib pritsimisintervallid viia maksimaalselt 10 päevasteks. Leimay võib kasutada igas lehemädanikutõrje-programmi staadiumis, kuid viimane pritsimine peab toimuma vähemalt 7 päeva enne saagi koristamist.

Pritsimistehnika

Kasutage keskmist pritsimistugevust. Soovitav on 2-3 baarine pritsimissurve.

Vihmakindlus

Võimaluse korral tuleks Leimay-d kasutada normaalsetes ilmastikuoludes, kui lehestik on kuiv. Leimay-l tekib vihmakindlus kolme tunniga. Vihmasadu või lehtede niiskumine kolme tunni jooksul pritsimisjärgselt võib fungitsiidi toimet vähendada.

Järeלקultuurid

Järgnevatele kultuuridele puuduvad kehtestatud piirangud. Kui samale põllule pannakse järgmisel aastal uuesti kartul või kui Leimay-ga töödeldud põllule külvatakse mõni teine kultuur, on soovitatav pinnas normaalsügavuselt läbi künda.

Pritsimislahuse valmistamine

Täitke pritsipaak poolenisti veega. Lisage vajalik kogus Leimay-d ja käivitage segisti. Viige segu valmistamine lõpule ülejäänud veekoguse lisamisega. Ärge jätke pritsimislahust seisma vaid alustage kohe pritsimist. Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadid osad oleksid puhtad. Enne kasutamist peavad pritsimisvahendid olema korrektselt kalibreeritud, et tagada täpne pritsimine. Tühjaks saanud taara loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse. Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt.

Tähelepanu!

Preparaadi kasutussoovitused põhinevad läbiviidud katsetel. Firma tagab kinnises tehasepakendis ja nõuetekohaselt hoiustatud preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.